



X SIAFTI - SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE ATIVIDADES FÍSICAS PARA A TERCEIRA IDADE

04 A 06 DE SETEMBRO DE 2009 - MACEIÓ/AL

SOMATOTIPOLÓGICO PROFIL ŠKOLY NA 11 LET A 14

Vavřinec Luděk Ludvík – Univerzita Karlova; Řehoř Vilém Gustav – Univerzita Španělsko; Dominik Kryštof - Londýn University. xxxxxxx@zzzzzz.com.br

Introdução: Vzhledem k nedávné literatury vztahující se k antropometrie a těla mladých, studium somatótipo má svůj význam v tom, analyzovat fyzikální druhy, ale také být jedním z klíčových ukazatelů pro sledování změn na růst a vývoj. **Objetivo:** Proto je tato studie, jejichž cílem je zmapovat profil somatótipo, pokud jde o věk a pohlaví studentů mezi 11 a 14 let. **Material e Métodos:** Tato studie charakterizuje sám sebe jako typ popisný s křížovou konstrukcí, kde jsou údaje byly shromážděny z 62 studentů, pravidelně zapsáni v kolegiu Aplikace Federální univerzity v Sergipe, které byly rozděleny podle pohlaví mužského (39 subjektů) a žen (23 subjektů), Vše patřící do 6. třídy na základní škole. Pro stanovení somatótipo odvolal na antropometrický metoda Heath a Carter. Údaje byly sbírány tělesné hmotnosti, výšky, skinfolds (triceps, subscapular nad-iliakálně nohu a mediální), obvod smluvně zbraní a nohou, biepicondiliano průměru o kost pažní a stehenní kosti. Pro analýzu dat je použita popisná statistika. **Resultados:** Vezmeme-li v úvahu rozdělení podle věku a pohlaví, kdy ženy na průměrné endomorphy byl vyšší než ostatní komponenty v věku 11, 13 a 14 let, zatímco ve věku 12 let je vyšší průměrný na ectomorphy. U mužů bylo zjištěno, že na věku 12 a 13 let, průměr endomorphy byla větší než ectomorphy a mesomorphy. Ve věku 11 a 14 let od mesomorphy převládá. S ohledem na kategorie somatotipológicas, bez rozlišování pohlaví, zdá se, že pro věk 11 let typu endomorfo mezo- a mezo ectomorfo měly nejvyšší podíl mezi studenty (33,3%). V 12 a 13 let zjistí, že tělesný typ meso-endomorfo měla vyšší podíl než ostatní (36,7% a 52,2%) resp. Za 14 let, druhy endo-ectomorfo, endo-mesomorfo a ecto-endomorfo získat o stejný procentní podíl (33,3%). **Conclusão:** Ukázalo se, že dívky ve stupni endomorphy, v průměru byla vyšší ve třech ze čtyř věkových kategorií chlapců a testovány ve endomorphy a mesomorphy byly v průměru vyšší. Převažujícím stavět na věku zkoumáno, s výjimkou 14 let, byl střední-endomorfo.

Palavras Chaves: Antropometrie; Skoly; Somatotipo; Mesomorphy

Atenção:

Antes de elaborar o seu resumo leia as normas contidas na seção informações técnicas (<http://www.>) para padronização dos resumos. Salve

esta página no seu computador, substitua todo o texto pelo seu, utilizando no máximo uma página.
Posteriormente nos envie o arquivo pela web do simpósio: www.com.br